



Avertissements agricoles

BRETAGNE

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

280, rue de Fougères, B.P. 67128, 35067 RENNES CEDEX, ☎ 99 36 01 74



Publication périodique

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

ÉDITION : CULTURES MARAÎCHÈRES, LÉGUMIÈRES ET POMMES DE TERRE

BULLETIN N°203

07 MARS 1991

PENSEZ A VOUS REABONNER...

Ce bulletin est le dernier que vous recevrez si vous n'avez pas renouvelé votre abonnement.

ACTUALITES EN SERRE

TOMATES.	Apparition de pucerons et acariens Attention au Botrytis Bourdons : sortez les ruches lors des traitements
LAITUES	Mildiou Nécrose marginale

NOUVELLES AUTORISATIONS DE VENTE

TOMATES

RAVAGEURS :

Avec le temps doux qui suit la période de froid de la 1ère quinzaine de février, les éclosions d'insectes et acariens commencent.

Observez attentivement vos cultures pour effectuer un traitement dès l'apparition des premiers foyers, mais pas avant, car des parasites naturels peuvent intervenir.

4050 43 158

1991 = N° 203, 209, 224, 234-
71

Contre les pucerons, utilisez Pirimor*, ou Hostaquick*.

Contre les acariens, dès l'apparition des premiers symptômes (points jaunes à la face supérieure des feuilles) effectuez deux traitements à 8 - 10 jours d'intervalle avec :

Kelthane * ; 1l/ha
ou Torque * ; 1kg/ha
ou Technacid * ; 1,2 kg/ha

Attention à la toxicité pour Technacid.
Dans tous les cas mouillez abondamment.

** Produits ayant fait l'objet d'une demande d'homologation.*

BOTRYTIS :

Taillez et effeuillez avec précaution car le Botrytis apparaît fréquemment sur les plaies de taille.

Complétez éventuellement par un badigeonnage avec un fongicide homologué sur cultures légumières.

BOURDONS :

Dans les serres où l'on utilise des bourdons pour la pollinisation, n'oubliez pas de sortir les ruches avant un traitement. Il est bon également de savoir que certains produits ont un effet répulsif qui peut durer une semaine (Technacid).

LAITUES

MILDIOU

Le temps actuel, doux et humide est favorable aux attaques de la maladie.

La protection doit être continue jusqu'au stade 16 feuilles.

Appliquez de préférence une association de mancozèbe et d'un produit systémique (Pulsan, Rhodax ...)

NECROSES MARGINALES (TIP BURN)

Sur le bord des feuilles de la "pomme", apparaissent de petites taches brunes de quelques millimètres de largeur. Ces nécroses servent de porte d'entrée au Botrytis, à des bactéries ... et les plantes pourrissent.

Ces nécroses sont fréquentes actuellement.

La lutte consiste à remédier au déséquilibre entre évaporation des feuilles et absorption en eau des racines par :

- . Des arrosages très fréquents mais peu abondants.
- . Un meilleur contrôle de la température et de l'aération en serre.

NOUVELLES AUTORISATION DE VENTE

VERTIMEC (m.a : Abamectin) est autorisé à la dose de 0,12 l/ha, contre la mouche mineuse et le thrips de la tomate, le thrips du chrysanthème et du rosier.

Délai d'emploi avant récolte : 1 j
Limite maximale de résidus : 0,01 ppm

TACHIGAREN (m.a hymexazol) est autorisé à la dose de 8 Kg/ha contre la fusariose de la tomate.

Délai d'emploi avant récolte : 15 j
Limite maximale de résidus : 1 ppm